

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ

Οι ανάγκες του Αρακά για μια καλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 14 kg /στρ. Μαγνήσιο (MgO) 2 kg/στρ.
Φώσφορος (P2O5) 10 kg /στρ. Ασβέστιο (CaO) 6 kg/στρ.
Κάλιο (K2O) 15 kg /στρ.

Η καλλιέργεια απαιτεί καλά αεριζόμενα εδάφη, που στραγγίζουν καλά το χειμώνα τα οποία επιτρέπουν μια καλή ανάπτυξη των αζωτοβακτηρίων. Προτιμώμενο pH = 6,0-7,5.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
10 μέρες μετά το φύτευμα	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
Πρώιμα στάδια	E-SOLUBLE 12-48-8 + TE 1-2 εφαρμογές <i>Οι λιπάνσεις γίνονται όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες</i>	5 kg/στρ.
Βλάστηση – Ανθοφορία	Νιτρικό Μαγνήσιο	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE Οι εφαρμογές να γίνονται ανά 5-7 μέρες	5 kg/στρ.
Τέλος ανθοφορίας - συγκομιδή	E-CALCIUM 11-9-27 + 5 % CaO + 2 MgO + TE 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE + TE Οι εφαρμογές να γίνονται ανά 5-7 μέρες	5 kg/στρ.

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό και κρύο καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
10 μέρες μετά το φύτευμα	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. <i>1 εφαρμογή</i>	300 ml/στρ.
Πρώιμα στάδια	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	300 ml/στρ. 100ml/στρ.
Βλάστηση – Ανθοφορία	E- FOLIAR 3-36-36 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% <i>1 εφαρμογή</i> AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος. <i>1 εφαρμογή</i>	500 gr/ στρ. 300 ml/στρ.
Τέλος ανθοφορίας - συγκομιδή	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) <i>1 εφαρμογή</i> E- FOLIAR 3-36-36 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% <i>2 εφαρμογές ανά 15 μέρες</i>	200 ml/στρ. 100ml/στρ 500 gr/ στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !