

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Οι ανάγκες της αχλαδιάς για μια καλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N)	14 kg /στρ.	Μαγνήσιο (MgO)	5 kg/στρ.
Φώσφορος (P2O5)	9 kg /στρ.	Ασβέστιο (CaO)	20 kg/στρ.
Κάλιο (K2O)	21 kg /στρ.		

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Πράσινη κορυφή</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%	400 gr/στρ.
	E-SOLUBLE 12-48-8 +TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
<i>Ρόδινη-λευκή κορυφή</i>	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , μέσω άρδευσης, συνολικά 2 φορές ανά 7-10 μέρες	5 kg/στρ.
<i>Πτώση πετάλων</i>	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E- CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B + 0,05 Mo , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
<i>Δέσιμο των καρπών</i>	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E- CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B + 0,05 Mo , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
<i>Μεγέθυνση των καρπών - ωρίμανση</i>	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE , εναλλάξ με	5 kg/στρ.
	E- CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B + 0,05 Mo , ανά 7-10 μέρες μέχρι τη συγκομιδή	5 kg/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%	400 gr/στρ.
	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Ρόδινη-λευκή κορυφή</i>	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) <i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i> AGTERPHOS Zn (0 - 28 - 5 + 9 % Zn)	300 ml/στρ. 100 ml/στρ. 300 ml/στρ.
<i>Πτώση πετάλων</i>	Set flower (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%) EVERYFERT FOLIAR 20-20-20 + TE	100 gr/στρ. 500 gr/ στρ.
<i>Δέσιμο των καρπών</i>	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, Zn- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %) AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) EVERYFERT FOLIAR 20-20-20 + TE	100 gr/στρ. 300 ml/στρ. 500 gr/ στρ.
<i>Μεγέθυνση των καρπών μέχρι την ωρίμανση</i>	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 3 φορές ανά 15 μέρες DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	300 ml/στρ. 100ml/στρ. 300 ml/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Quelatec Zn (Zn-EDTA 14 %) Nutriphuse (N 20 %) 2 εφαρμογές	300 ml/στρ. 100 gr/στρ. 1-2 λίτρα/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Συνδυάστε τις διαφυλλικές εφαρμογές με την φυτοπροστασία. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των φυτοφαρμάκων!

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !