

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΟΝΙΟΥ

Οι ανάγκες του πεπονιού για μια υψηλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 21 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 6 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 15 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 20 kg στρ.

Κάλιο (K2O) 34 kg /στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
1: Μεταφύτευση – έναρξη ανθοφορίας	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%) 1 εφαρμογή	500 gr/στρ.
	E-SOLUBLE 12-48-8 + TE , μέσω άρδευσης, 3 εφαρμογές	3 kg/στρ.
2: Ανθοφορία- ολοκλήρωση καρπόδεσης	Aminobor Ca (EI- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 1 εφαρμογή	1 lt/στρ. 300 ml/στρ.
	Νιτρικό μαγνήσιο 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 20-20-20 + TE 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 CaO + 2 MgO + TE 3 εφαρμογές	5 kg/στρ.
3: Ολοκλήρωση καρπόδεσης -συγκομιδή	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE , 3 εφαρμογές	5 kg/στρ.

Προτεινόμενες ποσότητες λιπασμάτων :

1- Στάδιο : 1 κιλό/μέρα. 2 - Στάδιο : 1,2 κιλά/μέρα. 3- Στάδιο : 1,5 κιλά/μέρα.

Στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια αντί για EVERYFERT SOLUBLE προτείνουμε τη χρήση της σειράς λιπασμάτων EVERYFERT PLUS, για πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά, υγρό και κρύο καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Μεταφύτευση – έναρξη ανθοφορίας	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με	300 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 1 εφαρμογή	100 ml/στρ.
Ανθοφορία-ολοκλήρωση καρπόδεσης	Set flower (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%) (καρποδετικό) 1 εφαρμογή	150 gr/ στρ.
	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος	300 ml/στρ.
Ολοκλήρωση καρπόδεσης -συγκομιδή	E- FOLIAR 20-20-20 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/ στρ.
	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) σε συνδυασμό με	200 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	100 ml/στρ.
	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	200 ml/στρ.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !