

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Οι ανάγκες του ακτινιδίου για μια απόδοση 5 τόνους/στρ. υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 23 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 5 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 9 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 20 κιλά/στρ.

Κάλιο (K2O) 30 kg /στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Έναρξη νέας βλάστησης	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%	500 gr/στρ.
	E-SOLUBLE 20-20-20 +TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
Μπουμπούκισμα	COCTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 24-8-24 + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
Ολοκλήρωση καρπόδεσης	E-SOLUBLE 24-8-24 + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	Νιτρικό Μαγνήσιο 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
Μεγέθυνση των καρπών - ωρίμανση	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , εναλλάξ με	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , ανά 7-10 μέρες μέχρι 20 μέρες πριν τη συγκομιδή	5 kg/στρ.
Μετά τη συγκομιδή	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%	200-400 gr/στρ.
	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Έναρξη νέας βλάστησης</i>	EveryFert Foliar 30-10-10 + TE <i>1-2 εφαρμογές, ανα 10 μέρες</i>	500 gr/στρ.
	AGTERPHOS Zn (0 - 28 - 5 + 9 % Zn)	300 ml/στρ.
<i>Μπουμπούκιασμα</i>	Aminobor Ca (L- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) <i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i>	300 ml/στρ. 100 ml/στρ.
<i>Ολοκλήρωση της καρπόδεσης</i>	Set flower (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%)	150 gr/στρ.
	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	100 gr/στρ.
<i>Μεγέθυνση των καρπών μέχρι την ωρίμανση</i>	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo)	300 ml/στρ.
	σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 3 φορές ανά 15 μέρες	200 ml/στρ.
	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 31%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	300 ml/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO)	300 ml/στρ.
	Quelatec Zn (Zn-EDTA 14 %) σε συνδυασμό με	150 gr/στρ.
	Nutriphuse (N 20 %) 1 εφαρμογή	1-2 λίτρα/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Συνδυάστε τις διαφυλλικές εφαρμογές με την φυτοπροστασία. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των φυτοφαρμάκων!

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !