

# Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Οι ανάγκες των εσπεριδοειδών για απόδοση πάνω από 8 τόνους/στρ. υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 25 kg /στρ. Μαγνήσιο (MgO) 3 kg/στρ.  
Φώσφορος (P2O5) 12 kg /στρ. Ασβέστιο (CaO) 10 kg/στρ.  
Κάλιο (K2O) 30 kg /στρ.

## ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

| Στάδιο                          | Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε                                                                                                                          | Δοσολογία                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Έναρξη νέας βλάστησης           | <b>Renewfert WG</b> (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15%<br>+ Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%,<br>K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25% | <b>500 gr/στρ.</b>                   |
|                                 | <b>E-SOLUBLE 20-20-20 +TE</b> , μέσω άρδευσης,<br><b>1 εφαρμογή</b>                                                                                    | <b>5 kg/στρ.</b>                     |
| Μπουμπούκισμα                   | <b>COCKTAIL AZ</b> ( Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %,<br>ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 %<br>B- 1,8%, Mo – 0,2 % )                                        | <b>1 kg/στρ.</b>                     |
|                                 | <b>E-SOLUBLE 24-8-24 + TE</b> , μέσω άρδευσης,<br><b>+ Νιτρικό Μαγνήσιο</b> <b>1 εφαρμογή</b>                                                          | <b>5 kg/στρ.</b><br><b>3 kg/στρ.</b> |
| Ολοκλήρωση καρπόδεσης           | <b>E-SOLUBLE 24-8-24+ TE</b> , μέσω άρδευσης,<br><b>1 εφαρμογή</b>                                                                                     | <b>5 kg/στρ.</b>                     |
|                                 | <b>Νιτρικό Μαγνήσιο</b> <b>1 εφαρμογή</b>                                                                                                              | <b>5 kg/στρ.</b>                     |
| Μεγέθυνση των καρπών - ωρίμανση | <b>E-SOLUBLE 15-10-30 + TE</b> ,<br><b>εναλλάξ με</b>                                                                                                  | <b>5 kg/στρ.</b>                     |
|                                 | <b>E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE</b> ,<br><b>ανά 7-10 μέρες μέχρι 20 μέρες πριν τη συγκομιδή</b>                                                     | <b>5 kg/στρ.</b>                     |
| Μετά τη συγκομιδή               | <b>Renewfert WG</b> (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15%<br>+ Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%,<br>K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25% | <b>500 gr/στρ.</b>                   |
|                                 | <b>COCKTAIL AZ</b> ( Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %,<br>ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 %<br>B- 1,8%, Mo – 0,2 % )                                        | <b>1 kg/στρ.</b>                     |

## ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

| Στάδιο                                             | Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε                                                                                                                 | Δοσολογία   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Έναρξη νέας βλάστησης</i>                       | <b>Nutriphuse</b> (N 20 %, καθαρό ουρικό άζωτο<br>άνευ διουρίας )                                                                             | 1 lit/στρ.  |
|                                                    | <i>σε συνδυασμό με</i><br><b>AGTERPHOS Zn</b> (0 - 28 - 5 + 9 % Zn)                                                                           | 300 ml/στρ. |
| <i>Μπουμπούκιασμα</i>                              | <b>Aminobor Ca</b> (L- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 %<br>+ B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i>                                                    | 300 ml/στρ. |
|                                                    | <b>Cophyl Max</b> (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)<br><i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i>                                                      | 100 ml/στρ. |
| <i>Πτώση πετάλων</i>                               | <b>Set flower</b> (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O<br>12,6% + <b>Mo 10% + B 8%</b> )                                                         | 150 gr/στρ. |
|                                                    | <b>AGTERPHOS Mg</b> (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO)                                                                                                | 300 ml/στρ. |
| <i>Ολοκλήρωση της καρπόδεσης</i>                   | <b>Every combi foliar</b> ( Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %,<br>ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 %<br>MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 % ) | 100 gr/στρ. |
|                                                    | <b>EveryFert foliar 20-20-20 + TE</b>                                                                                                         | 500 gr/στρ. |
| <i>Μεγέθυνση των καρπών<br/>μέχρι την ωρίμανση</i> | <b>Agtecal</b> (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe,<br>Mn, Cu, Zn, B, Mo)                                                                     | 300 ml/στρ. |
|                                                    | <i>σε συνδυασμό με</i><br><b>Cophyl Max</b> (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)<br><b>3 φορές ανά 15 μέρες</b>                                      | 100 ml/στρ. |
|                                                    | <b>DRAKAR K</b> (Οργανικό Κάλιο 31%)<br><b>2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών</b>                                                              | 300 ml/στρ. |
| <i>Μετά τη συγκομιδή</i>                           | <b>Quelatec Zn</b> (Zn-EDTA 14 %)                                                                                                             | 150 gr/στρ. |
|                                                    | <b>Every combi foliar</b> ( Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %,<br>ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 %<br>MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 % ) | 100 gr/στρ. |

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

**Συνδυάστε τις διαφυλλικές εφαρμογές με την φυτοπροστασία. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των φυτοφαρμάκων!**

**Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !**