

Η λίπανση της φράουλας

Το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού συστήματος της φράουλας αναπτύσσεται στα πρώτα 15 εκατοστά του εδάφους, γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται βαθιά η ενσωμάτωση των λιπασμάτων (ανόργανων και οργανικών).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Βασική λίπανση:

100 κιλά/στρέμμα **EVERYHUM 13-7-13 + 2 MgO + TE + 30% Λεοναρδίτη**, πριν τη μεταφύτευση, με ενσωμάτωση σε βάθος 10-15 εκ.

Επιφανειακή λίπανση :

1. ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ):

- Κάνουμε 2-3 υδρολίπανσεις με **EVERYFERT PLUS 18-18-18 +TE**, 2-3 κιλά/στρέμμα ανά 7-10 μέρες.
- Εφαρμόζουμε διαφυλλικά το **Aminobor** 300 ml/100 λίτρα + **Cophyl Max**, 100 ml/100 λίτρα νερό κάνοντας συνολικά 2-3 εφαρμογές ανά 15 μέρες.
- Συνεχίζουμε με **EVERYFERT CALCIUM 14-9-23 + 4 CaO + 2 MgO + TE** 3-4 κιλά την εβδομάδα.

2. ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Υδρολίπανση

- Χορηγούμε τα εξής υδατοδιαλυτά λιπάσματα:
- **EVERYFERT CALCIUM 14-9-23 + 4 CaO + 2 MgO + TE**, 5-7 κιλά την εβδομάδα, αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες.
- Διορθώνουμε με **EVERYFERT PLUS 18-18-18 +TE**, για καλύτερη ευρωστία των φυτών 2-3 κιλά/στρ. σε συνδυασμό με **PROTEC** (χουμικά οξέα με ασβέστιο EDTA), 1 λίτ./στρ. Συνήθως κάνουμε 3 λιπάνσεις με **E. CALCIUM 14-9-23 + 4 CaO + 2 MgO + TE** και 1 λίπανση με **E. PLUS 18-18-18 +TE (Αναλογία 3:1)**.
- Κάθε 20 μέρες χρησιμοποιούμε 0,5-1 κιλό/στρέμμα **EVERYCOMBI DRIP. (Ιχνοστοιχεία)**
- Τον τελευταίο μήνα: **E. CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE**, 7-10 κιλά την εβδομάδα.

Διαφυλλικές εφαρμογές

- Στην έναρξη της ανθοφορίας εφαρμόζουμε διαφυλλικά το **AMINOBOR Ca** 300-400 cc/100 λίτρα νερό, μαζί με **Cophyl Max** 100 ml/100 λίτρα νερό.
- Μαζί με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούμε τα διαφυλλικά **EVERYFERT foliar 20-20-20 + TE** και **EVERYFERT foliar 3-36-36 + TE**, 400-500 γραμ./100 λίτρα νερό.
- Για καλύτερη πρόσληψη Ασβεστίου χρησιμοποιούμε το **Agtecal** 300-400 ml/100 λίτρα + **Cophyl Max**, 100 ml/100 λίτρα νερό.
- Για να πετύχουμε καλύτερη ωρίμανση εφαρμόζουμε διαφυλλικά το **DRAKAR K** (οργανικό κάλιο) με 200-300 cc/100 λίτρα νερό (πρωιμότητα, χρώμα, σάκχαρα, μέγεθος και γεύση).

Ελέγξτε πάντα την αγωγιμότητα του νερού και του εδάφους.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2000 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφопενίες.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !