

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ

Οι ανάγκες του καρπουζιού για απόδοση πάνω από 8 τόνους/στρ. υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 20 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 6 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 12 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 10 κιλά/στρ.

Κάλιο (K2O) 26 kg /στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Πρώτο στάδιο: μεταφύτευση - ξεσκέπασμα των φυτών	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	400-500 γρ./στρ.
	E-SOLUBLE 12-48-8 + TE <i>3 εφαρμογές</i>	2 kg/στρ.
Δεύτερο στάδιο: Από το ξεσκέπασμα έως την άνθηση	Set Flower , (καρποδετικό)	150 gr/στρ.
	E PLUS 18-18-18 + TE <i>1 εφαρμογή</i>	3 kg/στρ.
	AMINOBOR Ca, + Cophyl Max <i>2 εφαρμογές ανά 15 μέρες.</i>	1 lit/στρ. 300 ml/στρ.
	E-SOLUBLE 20-20-20 + TE, <i>2 εφαρμογές</i>	3-4 kg/στρ.
Τρίτο στάδιο: Άνθηση - ολοκλήρωση της καρπόδεσης	Νιτρικό Μαγνήσιο <i>1 εφαρμογή</i>	4 kg/στρ
	E-Calcium 17-9-17+ 4 CaO + 2 MgO + 0,1B + 0,05Mo <i>μέσω άρδευσης, 2 εφαρμογές</i>	5 kg/στρ.
	HUMITEC <i>1 εφαρμογή μέσω άρδευσης</i>	2 lit /στρ.
	Νιτρικό Μαγνήσιο <i>1 εφαρμογή μέσω</i>	4 kg/στρ
Τέταρτο στάδιο: Ολοκλήρωση της καρπόδεσης – ωρίμανση.	E- Calcium 14-9-23 + 4 CaO + 2 MgO + 0,1B + 0,05Mo <i>4 εφαρμογές</i>	5 kg/στρ.
	<i>Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το λίπασμα</i>	
	E- Calcium, 14-9-23 + 4 CaO + 2 MgO + 0,1B + 0,05Mo	4- 5 kg/στρ.
	<i>Εναλλάξ με το E- Calcium 14-0-28 + 10 CaO + 0,1B + 0,05Mo μέχρι τη συγκομιδή</i>	4- 5 kg/στρ.
	Σ 'αυτό το στάδιο λιπαίνουμε σε κάθε πότισμα.	

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια αντί για **EVERYFERT SOLUBLE** προτείνουμε τη χρήση της σειράς λιπασμάτων **EVERYFERT PLUS**, για πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά, υγρό και κρύο καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Πρώτο στάδιο: μεταφύτευση - ξεσκέπασμα των φυτών	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
Δεύτερο στάδιο: Από το ξεσκέπασμα έως την άνθηση	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με	300 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 1 εφαρμογή	100ml/στρ.
	BIOBROT (El- αμινοξέα 7 % + N 5,5% + P2O5 5 % + K2O 3,5 % + Fe, Mn, Mo, Zn) 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
Τρίτο στάδιο: Άνθηση - ολοκλήρωση της καρπόδεσης	Set flower (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%)	100 γρ/στρ.
	E FOLIAR 20-20-20 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/στρ.
Τέταρτο στάδιο: Ολοκλήρωση της καρπόδεσης – ωρίμανση.	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) , σε συνδυασμό με	200 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 2 εφαρμογές	100ml/στρ.
	E FOLIAR 3-36-36 + TE, 2 εφαρμογές	500 gr/στρ.
	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές ανά 15 ημέρες	200ml/στρ.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδιάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !