

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ

Οι ανάγκες του κρεμμυδιού για μια υψηλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 15 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 5 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 10 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 10 κιλά/στρ.

Κάλιο (K2O) 20 kg /στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
1:5-10 πρώτα φύλλα	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%) 1 εφαρμογή	500 gr/στρ.
	E-SOLUBLE 24-8-24 + TE , μέσω άρδευσης, 2 εφαρμογές ανά 10 μέρες	5 kg/στρ.
2: Ανάπτυξη του στελέχους	Νιτρικό μαγνήσιο 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 CaO + 2 MgO + TE 3 εφαρμογές ανά 10 μέρες	5 kg /στρ.
	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%) 1 εφαρμογή	500 gr/στρ.
3:Ανάπτυξη του βολβού-Συγκομιδή	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE , 2 εφαρμογές	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE , 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
1:5-10 πρώτα φύλλα	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
	Aminobor Ca (EI- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με	300 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 1 εφαρμογή	100 ml/στρ.
2: Ανάπτυξη του στελέχους	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος	300 ml/στρ.
	E- FOLIAR 20-20-20 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA 0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/ στρ.
3:Ανάπτυξη του βολβού- Συγκομιδή	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) σε συνδυασμό με	200 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	100 ml/στρ.
	E FOLIAR 3-36-36 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA 0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/στρ.
	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	200ml/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !