

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

Οι ανάγκες του μαρουλιού για μια καλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Αζωτο (N)	14 kg /στρ.	Μαγνήσιο (MgO)	2 kg/στρ.
Φώσφορος (P2O5)	6 kg /στρ.	Ασβέστιο (CaO)	6 kg /στρ.
Κάλιο (K2O)	24 kg /στρ.		

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Μεταφύτευση	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
Επόμενες 10 μέρες :	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE μέσω άρδευσης Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	1 kg/στρέμμα την ημέρα 500 gr/στρ.
Επόμενες 15 μέρες	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE μέσω άρδευσης PROTEC (Ολικά Χουμικά:10%, Χουμικά Οξέα: 8%, Φουλβικά Οξέα: 2% Ασβέστιο (CaO-EDTA): 2.8%)	1,5 kg/στρ. την ημέρα 2 lt /στρ.
Επόμενες 15 μέρες	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE μέσω άρδευσης, Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	1,5 kg/στρ. την ημέρα 500 gr/στρ.
Επόμενες μέρες μέχρι τη συγκομιδή	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE, μέσω άρδευσης	1,5 kg/στρ. την ημέρα

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό και κρύο καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφопενίες.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Μεταφύτευση</i>	E - FOLIAR 20-20-20 + TE	500 gr/στρ.
Επόμενες 10 μέρες	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	300 ml/στρ. 100ml/στρ.
Επόμενες 15 μέρες	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	300 ml/στρ. 100ml/στρ
Επόμενες 15 μέρες	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	200 ml/στρ. 100ml/στρ
Επόμενες μέρες μέχρι τη συγκομιδή	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%)	200 ml/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση** και **Φυλλοδιαγνωστική**.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !