

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση**.

Το άζωτο που χρειάζεται σε μεγάλες ποσότητες το παίρνει απευθείας από την ατμόσφαιρα μέσω των αζωτοβακτηριδίων που έχει στις ρίζες της.

Η εφαρμογή **αζωτούχων λιπασμάτων** στη βλαστική περίοδο μειώνει την δράση των αζωτοβακτηριδίων.

Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, συνιστούμε μία γενική **βασική λίπανση**, με λιπάσματα όπως **0-46-0, Patentkali, 12-12-17 + 2 MgO + TE** και άλλα παρόμοια (SOP), σε ποσότητα 50-100 κιλών/ στρ. πριν την εγκατάσταση.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Σε κάθε πότισμα που κάνουμε και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποιούμε το λίπασμα E-CALCIUM 11-9-27 + 5 CaO + 2 MgO + TE, 6-8 kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Προτείνουμε τις εξής διαφυλλικές λιπάνσεις:

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Έναρξη Βλάστησης</i>	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού.	300 ml/στρ.
	Aminobor Ca (EI- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i>	300 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	100ml/στρ.
<i>Βλαστική Ανάπτυξη</i>	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος	300 ml/στρ.
	E FOLIAR 20-20-20 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2%	500 gr/στρ.
<i>Έναρξη ανθοφορίας</i>	E FOLIAR 3-36-36 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2%	500 gr/στρ.
7 μέρες μετά από κάθε κόψιμο	E FOLIAR 3-36-36 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%,Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2%	500 gr/στρ.
	1-2 εφαρμογές ανά 10 μέρες	