

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

Οι ανάγκες της ροδακινιάς για μια υψηλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 20 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 5 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 6 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 20 κιλά/στρ.

Κάλιο (K2O) 25 kg /στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Ρόδινη κορυφή</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
	E-SOLUBLE 20-20-20 +TE , μέσω άρδευσης, <i>1 εφαρμογή</i>	5-7 kg/στρ.
<i>Πτώση πετάλων</i>	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %	1 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 24-8-24 + TE , μέσω άρδευσης, <i>1 εφαρμογή</i>	5 kg/στρ.
	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , <i>1 εφαρμογή</i>	5 kg/στρ.
<i>Γλίστρημα κάλυκα</i>	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE <i>1 εφαρμογή</i>	5-7 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE <i>1 εφαρμογή</i>	5 kg/στρ.
	Νιτρικό Μαγνήσιο <i>1 εφαρμογή</i>	5 kg/στρ.
<i>Ανάπτυξη καρπού - ωρίμανση</i>	E-SOLUBLE 15-10 -30 +TE εναλλάξ με	5-7 kg/στρ.
	E-CALCIUM 14-0-28 + 10 C ανά 7-10 μέρες, μέχρι 15 μέρες πριν τη συγκομιδή	5 kg/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15%, + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Ρόδινη κορυφή</i>	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) <i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i>	300 ml/στρ. 100 ml/στρ.
<i>Πτώση πετάλων</i>	Set flower (El- αμινοξέα 5% + P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%) BIOBROT (El- αμινοξέα 7 % + N 5,5% + P2O5 5 % + K2O 3,5 % + Fe, Mn, Mo, Zn)	150 gr/στρ. 200 ml/στρ.
<i>Γλίστρημα κάλυκα</i>	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43%, MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %) AGTEPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO)	100 gr/στρ. 300 ml/στρ.
<i>Ανάπτυξη καρπού - ωρίμανση</i>	AGTEPHOS Ca (3 - 23,6 - 0 + 3,6 % CaO) Agtecal <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max 3 εφαρμογές ανά 15 μέρες DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	300 ml/στρ. 200 ml/στρ. 100 ml/στρ. 200 ml/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	AGTEPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Quelatec Zn (Zn-EDTA 14 %) Nutriphuse (N 20 %) 2 εφαρμογές Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 %, MgO EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	300 ml/στρ. 100 gr/στρ. 1-2 λίτρα/στρ. 100 gr/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.