

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

Οι ανάγκες της ροδιάς για μια απόδοση 4-5 τόνους/στρ. υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N)	24 kg /στρ.	Μαγνήσιο (MgO)	6 kg/στρ.
Φώσφορος (P2O5)	10 kg /στρ.	Ασβέστιο (CaO)	20 κιλά/στρ.
Κάλιο (K2O)	32 kg /στρ.		

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

- Στην έναρξη της βλάστησης λιπαίνουμε μέσω άρδευσης με **E-SOLUBLE 20-20-20 +TE**, 5 κιλά/στρ. μέσω άρδευσης, συνολικά **3 φορές** ανά **7-10** μέρες.
- Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών εφαρμόζουμε μέσω άρδευσης 0,5-1 κιλά/στρ **COCKTAIL AZ** (Μίγμα ιχνοστοιχείων).
- Συνεχίζουμε τις υδρολιπάνσεις με **E-SOLUBLE 16-8-24 + 4 MgO +TE**, 5-7 κιλά/στρ., κάθε **7-10** μέρες, ρίχνοντας συνολικά **40-50** κιλά λίπασμα το στρέμμα.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Φούσκωμα του κάλυκα	AGTERPHOS Zn (0-28-5 + 9 % Zn)	200 ml/στρ.
	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i>	300 ml/στρ.
	Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	100ml/στρ.
	<i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i>	
Πτώση πετάλων	AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO)	300 ml/στρ.
	BIOBROT (El- αμινοξέα 7 % + N 5,5% + P2O5 5 % + K2O 3,5 % + Fe, Mn, Mo, Zn)	300ml/στρ.
	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	50-70 gr/στρ.
Μεγέθυνση του καρπού	AGTERPHOS Ca (3 - 23,6 - 0 + 4,3% CaO) 2-3 φορές ανά 15 μέρες	300 ml/στρ.
	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) 3 φορές ανά 15 μέρες για να μεγεθύνουμε τους καρπούς και να μειώσουμε το σκάσιμο	200ml/στρ.
Έναρξη ωρίμανσης	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	200 ml/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !