

Η ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Με τη **διαφυλλική λίπανση** καλύπτουμε άμεσα κάποιες ανάγκες του φυτού στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης του, επηρεάζοντας καθοριστικά **την ευρωστία των φυτών, του ριζικού συστήματος, την αντοχή στις αντίξοες συνθήκες, τη φωτοσύνθεση, την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και την γενική απόδοση.**

Προτείνουμε τις εξής διαφυλλικές λιπάνσεις:

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Έναρξη αδελφώματος	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε «ενεργειακή ώθηση» στην καλλιέργεια, διεγείροντας την ανάπτυξη των ριζών και κατά συνέπεια των βλαστών E FOLIAR 30-10-10 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2%	300 ml/στρ. 300-500 gr/στρ.
Ολοκλήρωση αδελφώματος	Nutriphuse (N 20 %) AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος	1 lt/στρ. 300 ml/στρ.
Έναρξη επιμήκυνσης στελέχους	E FOLIAR 30-10-10 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2%	300-500 gr/στρ.
Επιμήκυνση στελέχους - Ξεστάχιασμα	E FOLIAR 20-20-20 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2-3 εφαρμογές ανά 15 μέρες	300-500 gr/στρ.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !