

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ

Ανάγκες: Για περίπου 2 τόνους/στρ. θέλουμε

N (Αζωτο)	14 κιλά	CaO (Ασβέστιο)	3 κιλά
P2O5 (Φώσφορος)	6 κιλά	MgO (Μαγνήσιο)	1 κιλό
K2O (Κάλιο)	15 κιλά		

Προτείνουμε για βασική λίπανση το E. GRANULAR 12-12-17 + 2 MgO + Fe + Zn, 50 kg/στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
3ο πραγμ. φύλλο	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
Επόμενες 10 μέρες :	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	5-7 κιλά την εβδομάδα 500 gr/στρ.
Επόμενες 15 μέρες	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	7-8 κιλά την εβδομάδα 500 gr/στρ.
Επόμενες μέρες- μέχρι τη συγκομιδή	E-CALCIUM 17-9-17 + 4 % CaO + 2 MgO + TE Εναλλάξ με E-CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + TE, Μέχρι τη συγκομιδή	7-8 κιλά την εβδομάδα 7-8 κιλά την εβδομάδα

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό και κρύο καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
3ο πραγμ. φύλλο	E - FOLIAR 20-20-20 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA 0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/στρ.
Επόμενες 10 μέρες	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	300 ml/στρ. 100ml/στρ.
Επόμενες 15 μέρες	E - FOLIAR 20-20-20 + TE Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA 0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2 εφαρμογές ανά 15 μέρες	500 gr/στρ.
Επόμενες μέρες- μέχρι τη συγκομιδή	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης)	300 ml/στρ. 100ml/στρ.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική.**

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !